

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR ARTSEN EN APOTHEKERS

Deze patiënt gebruikt Natriumoxybaat als behandeling voor narcolepsie met kataplexie.

Natriumoxybaat kan ademhalings- en CZS depressie, epileptische aanvallen, psychotische gebeurtenissen, depressie en suïcidaliteit veroorzaken.

Alcohol mag niet gebruikt worden tijdens de behandeling met Natriumoxybaat.

Opioiden en barbituraten mogen niet gelijktijdig met Natriumoxybaat worden gebruikt. Het gebruik van andere adem-halings- en CZS- onderdrukkende middelen moet worden vermeden. Wees extra voorzichtig met het gebruik van topiramaat en valproaat gelijktijdig met Natriumoxybaat. Natriumoxybaat kan misbruik/oneigenlijk gebruik/ afhankelijkheid veroorzaken.

Raadpleeg de samenvatting van de product-kenmerken van Natriumoxybaat voordat u deze patiënt andere geneesmiddelen voorschrijft of verstrekt.

Let op: Er zijn ook andere dranken met natriumoxybaat in de handel. Elke drank moet op zijn eigen manier klaargemaakt worden. Wijs de patiënt erop hoe dit middel gebruikt moet worden. Gebruik alleen de spuit die in de verpakking bij het middel zit.

Deze kaart is online beschikbaar op www.accord-healthcare.com/nl/rmm-oxybaat.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb op www.lareb.nl

Aanvullende informatie betreffende natriumoxybaat is beschikbaar in de samenvatting van product-kenmerken (SmPC) en bijsluiters op <http://www.cbqg-meb.nl>

U kunt extra materiaal opvragen bij Accord Healthcare B.V.
T: +31 30 850 6014
E: netherlands@accord-healthcare.com

Datum waarop Natriumoxybaat 500mg/ml voor het eerst is voorgeschreven: / /

CONTACT INFORMATIE

Naam van patiënt

.....

Telefoonnummer van patiënt

.....

Naam van naast familielid

.....

Naam van behandelend arts

.....

Telefoonnummer van behandelend arts

.....

Telefoonnummer bij medische nood

.....