

Ten lek Princex, zawiera syldenafil, może Panu pomóc uzyskać erekcję, jeśli występują u Pana zaburzenia wzrodu, czyli niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Ten lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez dorosłych mężczyzn, w wieku powyżej 18 roku życia.



Prosimy aby przed przyjęciem leku odpowiedział Pan na pytania znajdujące się poniżej. Pozwoli to określić, czy może Pan zastosować ten lek samodzielnie i bezpiecznie.



**Czy przyjmuje Pan którykolwiek z poniżej wymienionych leków, stosowanych w łagodzeniu objawów choroby wieńcowej (duszniczy bolesnej, „ból w klatce piersiowej”)?**

- nitroglicerynę (np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit)
- monoazotan izosorbidu (np. Effox, Effox long, Isosorbide Mononitrate Vitabalans, Mono Mack Depot, Mononit, Monosan, Olicard)
- molsidominę (np. Molsidomina WZF)
- pentaerytrytol (np. Galpent, Pentaerythritol compositum)

**Czy występuje lub w przeszłości wystąpił u Pana choćby jeden z poniżej wymienionych objawów, które mogą wskazywać na choroby serca i naczyń**

- ból, pieczenie, uczucie ciężkości, gniecenia w klatce piersiowej po wysiłku, również jeśli zdarza się to w czasie stosunku płciowego
- duszność, uczucie braku tchu w czasie wysiłku (np. wchodzenia po schodach, spaceru)
- kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, nierówne bicie serca
- omdlenie, utrata przytomności, zawroty głowy
- niskie (< 90/50 mmHg) lub wysokie (> 160/90 mmHg) ciśnienie tętnicze

**Czy choruje/leczy się Pan obecnie z powodu choćby jednej z poniżej wymienionych chorób:**

- zaburzeń erekcji i przyjmuje już Pan jakiegokolwiek leki z tego powodu
- nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach)
- choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy
- wirusowego zapalenia wątroby
- marskości wątroby
- zakażenia wirusem HIV
- szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego)
- chorób krwi (białaczki, zaburzeń krzepnięcia)
- niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (dziedziczna choroba krwi)
- hemofilia (choroba krwi z ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia krwi)
- zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (choroba oczu)

**Czy którykolwiek z przedstawionych poniżej stanów występuje obecnie lub wystąpił u Pana w przeszłości:**

- w ostatnich 6 miesiącach przebył Pan zawał serca lub udar mózgu
- zniekształcenie, skrzywienie prącia, stwardnienie prącia (choroba Peyroniego) lub bolesna, nieustająca erekcja trwająca kilka godzin (priapizm)
- utratę lub osłabienie wzroku w jednym oku z innej przyczyny niż jaskra, zaćma lub uraz
- nagłą utratę słuchu
- uczulenie na syldenafil lub którykolwiek ze składników produktu Princex

TAK	NIE WIEM	NIE
TAK	NIE WIEM	NIE
TAK	NIE WIEM	NIE
TAK	NIE WIEM	NIE



**Jeśli wszystkie odpowiedzi to odpowiedzi „NIE”, po zapoznaniu się z ulotką dołączoną do opakowania, może Pan przyjąć lek Princex, 25 mg, tabletki powlekane.**

Jeśli nadal Pan nie jest pewien, czy może zastosować lek Princex, 25 mg, tabletki powlekane, może Pan skonsultować się z farmaceutą. Proszę pamiętać, aby w trakcie okresowych wizyt poinformować lekarza o zaburzeniach erekcji i przyjmowanych lekach

Jeśli choćby jedna odpowiedź to „TAK” lub choćby jedna odpowiedź to „NIE WIEM”

**NIE POWINIEN PAN PRZYJMOWAĆ LEKU Princex, 25 mg, tabletki powlekane**

Jeśli stosowanie leków z powodu zaburzeń erekcji jest konieczne, należy skonsultować się z lekarzem