

KARTA PRZYPOMINAJĄCA DLA PACJENTA Z GRUPY RYZYKA

Przepisano Państwu lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord w profilaktyce przedekspozycyjnej w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV-1. Aby ten lek był skuteczny, bardzo ważne jest, by nie pomijać zalecanych dawek. Zalecana dawka leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord to jedna tabletkę na dobę.

W przypadku trudności z połknięciem, tabletkę można rozkruszyć czubkiem łyżki. Następnie proszek wymieszać z około 100 ml (pół szklanki) wody, soku pomarańczowego lub winogronowego i natychmiast wypić.

Należy przyjmować lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord dokładnie w taki sposób jak zalecił lekarz. Ma to na celu zapewnienie pełnej skuteczności leku oraz ograniczenie powstawania oporności na lek. Nie należy zmieniać dawki leku dopóki nie zaleci tego lekarz.

Ważne jest, aby nie pomijać żadnej dawki leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord.

- Jeżeli minęło mniej niż 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord, należy przyjąć tabletkę tak szybko jak to możliwe, najlepiej z jedzeniem. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.
- Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Należy odczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze, najlepiej z jedzeniem.

Jeżeli przed upływem 1 godziny od przyjęcia leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord wystąpią wymioty, należy przyjąć kolejną tabletkę. Nie trzeba przyjmować kolejnej tabletki, jeśli wymioty wystąpiły później niż po upływie 1 godziny od przyjęcia leku.

Jeżeli to możliwe, należy przyjmować lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord wraz z posiłkiem. Ważne jest aby przyjmowanie leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord stanowiło część codziennej rutyny, np. podczas jedzenia lunchu lub przy myciu zębów po śniadaniu. Jest ważne, by określić optymalną porę przyjmowania leku.

Może w tym pomóc użycie pudełka na leki z podziałką na każdy dzień i wkładanie do niego tabletek na cały tydzień.

Kolejną pomocą może być używanie kalendarza do zaznaczania każdego dnia, po przyjęciu leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord. Rozpoczynając przyjmowanie leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę po zażyciu leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord®. Można również notować datę przyjęcia pierwszej tabletki leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord z nowego opakowania. W razie braku pewności, że lek został przyjęty, można obliczyć liczbę tabletek pozostawionych w opakowaniu.

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota	Niedziela
Tydzień 1							
Tydzień 2							
Tydzień 3							
Tydzień 4							
Tydzień 5							
Tydzień 6							

Jeżeli stosujecie państwo kalendarz w telefonie komórkowym lub na komputerze można włączyć przypomnienie o konieczności przyjęcia leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord

Data przyjęcia pierwszej tabletki leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord z nowego opakowania (DD/MM/YYYY):

Zgłaszanie działań niepożądanych

Ważne jest, aby niezwłocznie zgłaszać do Accord Healthcare jakiegokolwiek podejrzewane działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord, aby pomóc w pełni scharakteryzować profil bezpieczeństwa produktu.

Działania niepożądane można zgłaszać także bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

Accord Healthcare Polska

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

tel: + 48 22 577 28 00

fax: + 48 22 577 29 01

email: office@accord-healthcare.pl